

ULOTKA DLA PACJENTA

- GlaxoSmithKline -

2008 -07- 16

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.
Lek ten jest dostępny bez recepty, aby pacjent mógł leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować SEBIDIN PLUS ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.
Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
Jeśli objawy nasilą się lub nie ustępują po 3 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

SEBIDIN PLUS

(Chlorhexidini dihydrochloridum + Acidum ascorbicum)

5 mg + 75 mg, tabletki do ssania

Bez cukru

Skład

Jedna tabletki zawiera substancje czynne:

Chlorheksydyny dichlorowodorek 5 mg

Kwas askorbowy 75 mg

oraz substancje pomocnicze: glicerolu distearynian, aspartam, ksylitol, mannitol, magnezu stearynian, makrogol 6000, krzemionka koloidalna bezwodna, żółcień chinolinowa E104, sorbitol.

Dostępne opakowania

16 lub 24 tabletek

Podmiot odpowiedzialny

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Spółka Akcyjna

ul. Grunwaldzka 189

60-322 Poznań

Spis treści

1. Co to jest SEBIDIN PLUS i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się SEBIDIN PLUS
3. Jak stosować SEBIDIN PLUS
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku SEBIDIN PLUS
6. Inne informacje

1. Co to jest SEBIDIN PLUS i w jakim celu się go stosuje

SEBIDIN PLUS jest lekiem o skojarzonym działaniu chlorheksydyny i witaminy C.

Chlorheksydyna wykazuje działanie przeciwbakteryjne: działa bakteriostatycznie i bakterioobójczo wobec bakterii Gram-dodatnich, Gram-ujemnych oraz drożdżaków *Candida albicans*.

Witamina C bierze udział w procesie tworzenia kolagenu i regeneracji tkanek.

Lek uzupełnia zwiększone zapotrzebowanie na kwas askorbowy występujące w stanach zapalnych błony śluzowej gardła i krtani.

SEBIDIN PLUS jest wskazany w:

- Zapaleniu błony śluzowej gardła.
- Zapobieganiu i leczeniu zapaleń dziąseł oraz chorób przyzębia.
- Zapaleniach błony śluzowej jamy ustnej o charakterze nieżytowym.
- Aftach przewlekłe nawracających, pleśniawkach, nadżerkach i odleżynach będących np. następstwem stosowania przez pacjentów źle dopasowanych uzupełnień protetycznych.
- Odkazaniu jamy ustnej przed i po zabiegach chirurgicznych.

2. Zanim zastosuje się SEBIDIN PLUS

Nie należy stosować leku SEBIDIN PLUS, jeśli występuje:

Nadwrażliwość na chlorheksydynę lub inne składniki leku.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek SEBIDIN PLUS

Stosowanie leku może zaburzać odczuwanie smaku, które zwykle ustępuje po 4 godzinach od zastosowania. Lek zaleca się stosować po spożyciu pokarmu.

W przypadku, gdy objawy nasiliły się lub nie ustępują po 3 dniach, należy skontaktować się z lekarzem. Jeśli lekarz zaleci kontynuację leczenia, nie należy stosować leku dłużej niż 14 dni bez ponownej konsultacji z lekarzem.

Podczas długotrwałego stosowania mogą wystąpić zmiany odcienia barwy zębów oraz grzbietu języka, które ustępują samoistnie lub muszą być usunięte przez lekarza.

U pojedynczych chorych (cierpiących na choroby przewodu pokarmowego i wątroby) mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe tj. nudności, wymioty, odbijanie. W tych przypadkach należy przerwać zażywanie leku.

Ciąża:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Lek nie wpływa na sprawność psychofizyczną oraz nie upośledza zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn będących w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Sebidin Plus

Lek zawiera źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Nie stwierdzono występowania interakcji z lekami.

3. Jak stosować SEBIDIN PLUS

Dorośli i dzieci w wieku od 12 lat: ssać 1 tabletkę 4 razy na dobę (co 6 godzin).

Lek zaleca się stosować po posiłku i oczyszczeniu zębów.

Przez 2 godziny po zastosowaniu leku nie zaleca się płukania jamy ustnej lub picia dużej objętości płynów.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zażycia większej dawki leku SEBIDIN PLUS niż zalecana:

Lek praktycznie nie wchłania się z przewodu pokarmowego i jest mało prawdopodobne wystąpienie przedawkowania.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku SEBIDIN PLUS:

Należy kontynuować stosowanie leku.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, SEBIDIN PLUS może powodować działania niepożądane.

Niekiedy mogą wystąpić reakcje alergiczne (rzadko występują wysypki na skórze oraz powierzchniowe złuszczenie się nabłonka błony śluzowej jamy ustnej i obrzęk ślinianek przyusznych), podrażnienie lub zapalenie błony śluzowej jamy ustnej oraz podrażnienie żołądka i biegunka.

U niektórych osób w czasie stosowania leku SEBIDIN PLUS mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku SEBIDIN PLUS

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku SEBIDIN PLUS po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6. *Inne informacje*

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Polska
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Spółka Akcyjna
ul. Grunwaldzka 189
60-322 Poznań
tel. (0 61) 860 12 00 fax (0 61) 867 57 17