

ULOTKA DLA PACJENTA

SPRAWDZONO
POD WZGLĘDEM
MERYTORYCZNYM
2008 -03- 27

Ylu

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.
Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek CODIPAR 500 ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

- *Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.*
- *Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.*
- *Jeśli objawy nasilą się lub nie ustępują po 10 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.*

CODIPAR 500
(Paracetamolum)
500 mg, czopki

Lek zawiera paracetamol

Skład

Jeden czopek zawiera:
substancję czynną: paracetamol 500 mg.
Substancje pomocnicze: lecytyna sojowa, tłuszcz obojętny

Dostępne opakowania
10 czopków.

Podmiot odpowiedzialny
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
ul. Grunwaldzka 189
60-322 Poznań

Spis treści:

1. *Co to jest CODIPAR 500 w postaci czopków i w jakim celu się go stosuje*
2. *Zanim zastosuje się CODIPAR 500 w postaci czopków*
3. *Jak stosować CODIPAR 500 w postaci czopków*
4. *Możliwe działania niepożądane*
5. *Przechowywanie leku CODIPAR 500 w postaci czopków*
6. *Inne informacje*

1. *Co to jest CODIPAR 500 w postaci czopków i w jakim celu się go stosuje*

CODIPAR 500 jest lekiem zawierającym paracetamol, który działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Nie wykazuje działania przeciwzapalnego.

CODIPAR 500 jest stosowany:

- w bólach różnego pochodzenia:
 - bóle głowy i zębów;
 - bóle mięśniowe, stawowe i kostne;
 - bolesne miesiączki;
 - bóle po zabiegach chirurgicznych i stomatologicznych;
- w gorączce w przebiegu przeziębienia lub grypy.

2. *Zanim zastosuje się CODIPAR 500 w postaci czopków*

Nie należy stosować czopków CODIPAR 500 w przypadku uczulenia na paracetamol lub inne składniki leku, ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek oraz w przypadku uzależnienia od alkoholu.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek CODIPAR 500 w przypadku:

- niewydolności wątroby i nerek;
- osób głodzonych i regularnie spożywających alkohol, gdyż istnieje szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby;
- uczuleń na salicylany (poniżej 5% osób uczulonych na salicylany może być również uczulonych na paracetamol.)

W czasie stosowania paracetamolu nie należy spożywać alkoholu.

Niewskazane jest jednoczesne stosowanie kilku leków zawierających paracetamol (acetaminofen), ponieważ może dojść do przedawkowania.

Ciąża:

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Lek nie zaburza sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń mechanicznych będących w ruchu.

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

- Paracetamol zwiększa siłę działania leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny i indandionu.
- Metoklopramid przyspiesza, a skopolamina opóźnia wchłanianie paracetamolu z przewodu pokarmowego (dotyczy podania doustnego).
- Kofeina zwalnia metabolizm wątrobowy paracetamolu, zwiększa siłę działania przeciwbólowego paracetamolu.
- Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu.
- Paracetamol stosowany z inhibitorami MAO (leki stosowane w psychiatrii i neurologii) może wywołać stan pobudzenia i wysoką gorączkę.
- Ryfampicyna, leki przeciwpadaczkowe, leki nasenne i alkohol stosowane z paracetamolem mogą spowodować uszkodzenia wątroby.

Podawanie paracetamolu jednocześnie z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi u pacjentów z niewydolnością nerek może nasilać chorobę nerek.

3. Jak stosować CODIPAR 500 w postaci czopków

- Lek podaje się doodbytniczo.
- Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 czopek 500 mg 4 do 6 razy na dobę.
- Nie stosować więcej niż 8 czopków na dobę.
- Przed zastosowaniem czopka należy wyjąć z opakowania bezpośredniego z folii.
- Czopków nie należy dzielić.

Maksymalna dawka dobową paracetamolu dla dorosłych podczas leczenia krótkotrwałego wynosi 4,0 g a podczas leczenia długotrwałego 2,6 g. Paracetamolu nie należy stosować u dzieci dłużej niż 3 dni a u dorosłych dłużej niż 10 dni bez zalecenia lekarza.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zażycia większej dawki leku CODIPAR 500 niż zalecana:

Wczesnymi objawami znacznego przedawkowania (na przykład po połknięciu leku przez dziecko) występującymi w pierwszych 24 godzinach od przyjęcia leku są: brak łaknienia, nudności, wymioty, bóle brzucha. W drugiej dobie może pojawić się żółtaczka, zaburzenia krzepnięcia krwi, hipoglikemia (niskie stężenie cukru we krwi), encefalopatia (zmiany zwyrodnieniowe w mózgu), śpiączka.

Sposób postępowania przy przedawkowaniu:
należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku CODIPAR 500:

Należy kontynuować stosowanie leku nie zwiększając następnej dawki.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. *Możliwe działania niepożądane*

Jak każdy lek, lek CODIPAR 500 może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku stosowania leku w zalecanych dawkach występują bardzo rzadko.

Mogą pojawić się:

- odczyny alergiczne: świąd, wysypka, rumień;
- zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego: nudności, wymioty;
- zaburzenia czynności wątroby i nerek;
- sporadycznie: methemoglobinemia (obecność utlenionej hemoglobiny we krwi), agranulocytoza (zmniejszenie liczby krwinek białych we krwi) i małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi.)

W przypadku zaobserwowania następujących objawów: świądu, wysypki, rumienia, wymiotów, należy odstawić CODIPAR 500 i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

U niektórych osób w czasie stosowania leku CODIPAR 500 mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. *Przechowywanie leku CODIPAR 500 w postaci czopków*

Lek należy przechowywać w suchym miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie należy stosować leku CODIPAR 500 po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. *Inne informacje*

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Spółka Akcyjna
ul. Grunwaldzka 189
60-322 Poznań
tel. (0-61) 8601-200 fax (0-61) 8675-717

2008-03-17