

ULOTKA DLA PACJENTA

- [Logo firmy] -

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.
Lek ten jest dostępny bez recepty, aby pacjent mógł leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować GLUCARDIAMID pastylki ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.
- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

YU

GLUCARDIAMID

(Nicethamidum + Glucosum)

125 mg + 1500 mg, pastylki

Skład

Jedna pastylka zawiera:

substancje czynne:

niketamid 125 mg

glukoza 1500 mg

oraz substancje pomocnicze:

glukozę ciekłą, sacharozę, tłuszcz stały, kwas cytrynowy jednowodny, sorbitanu monooleinian, wosk biały, żółcień chinolinową (E104), butylohydroksyanizol, butylohydroksytoluen

Dostępne opakowania

Opakowanie zawiera 10 lub 20 pastylek.

Podmiot odpowiedzialny

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań

Miejsce wytwarzania:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „EWA” S.A.

ul. Zamkowy Folwark 9

63-700 Krotoszyn

Spis treści:

1. Co to jest GLUCARDIAMID i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się GLUCARDIAMID
3. Jak stosować GLUCARDIAMID
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku GLUCARDIAMID
6. Inne informacje

1. Co to jest GLUCARDIAMID i w jakim celu się go stosuje

Niketamid działa pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy. Powoduje zwiększenie wrażliwości ośrodkowego układu oddechowego na dwutlenek węgla, podwyższa objętość oddechową i nasila częstość oddechów.

Zwiększając częstość uderzeń serca, rzut minutowy serca i ciśnienie w tętnicach płucnych, podwyższa ciśnienie krwi zwłaszcza u pacjentów z hipotensją. Glukoza zawarta w preparacie GLUCARDIAMID służy jako źródło energii dla organizmu.

GLUCARDIAMID można stosować pomocniczo w:

- stanach dużego i długotrwałego wysiłku fizycznego,
- stanach przewlekłego osłabienia i zmęczenia.

2. Zanim zastosuje się GLUCARDIAMID

Nie należy zażywać leku GLUCARDIAMID jeśli występują:

- uczulenie na którykolwiek ze składników leku,
- tachykardia (przyspieszona akcja serca) i poważne zaburzenia rytmu serca,
- niestabilna dusznica bolesna,
- nie stosować u dzieci do 12. roku życia.

Zachować szczególną ostrożność stosując GLUCARDIAMID:

Ostrożnie (po konsultacji z lekarzem) stosować:

- w ciężkiej astmie oskrzelowej, gdy lek może spowodować znaczący skurcz oskrzeli;
- w nadciśnieniu tętniczym;
- w nadczynności tarczycy;
- w padaczce, gdyż może powodować obniżenie progu drgawkowego;
- w cukrzycy.

Niketamid znajduje się na liście leków farmakologicznych uznanych za środki dopingu, opracowanej przez Komisję do Zwalczania Dopingu. Może powodować wystąpienie dodatnich wyników niektórych testów antydopingowych.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Ciąża:

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Nie zaleca się stosowania GLUCARDIAMIDU w okresie ciąży ze względu na brak badań potwierdzających bezpieczeństwo.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Nie zaleca się stosowania GLUCARDIAMIDU w okresie karmienia piersią ze względu na brak badań potwierdzających bezpieczeństwo.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Lek nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu.

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Przy zalecanych dawkach nie obserwowano interakcji GLUCARDIAMIDU z innymi lekami. Lek należy stosować ostrożnie u chorych przyjmujących leki sympatykomimetyczne i inhibitory monoaminooksydazy oraz łącznie z lekami powodującymi relaksację mięśni.

3. Jak stosować GLUCARDIAMID

Doustnie: ssać 4 do 6 pastylek na dobę.

W przypadku wrażenia, że działanie leku GLUCARDIAMID jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zażycia większej dawki leku GLUCARDIAMID niż zalecana:

GLUCARDIAMID nawet po połknięciu w całości wielu pastylek jest uwalniany powoli i znaczna część leku zostaje w tym czasie wydalona

Przy znacznym przekroczeniu zalecanych dawek mogą wystąpić: przyspieszony oddech, nudności, wymioty, nadmierna potliwość, świąd, kichanie, niepokój, drgawki padaczkopodobne.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku GLUCARDIAMID:

Należy kontynuować stosowanie leku nie zwiększając następnej dawki.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. *Możliwe działania niepożądane*

Jak każdy lek, lek GLUCARDIAMID może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane mogą objawiać się: obniżeniem progu drgawkowego, uporczywym kaszlem, skurczem oskrzeli i bólem głowy.

Do poważniejszych działań niepożądanych można zaliczyć uczynnienie objawów porfirii, charakteryzujących się napadowymi bólami brzucha, zaburzeniami neurologicznymi i psychicznymi.

U niektórych osób w czasie stosowania leku GLUCARDIAMID mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. *Przechowywanie leku GLUCARDIAMID*

Lek należy przechowywać w suchym miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od wilgoci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie należy stosować leku GLUCARDIAMID po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. *Inne informacje*

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Spółka Akcyjna

ul. Grunwaldzka 189

60-322 Poznań

tel. (0-61) 8601-200 fax (0-61) 8675-717

Data opracowania ulotki:

2008-06-24

3.3/05.05.08/core 05.08