

Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.
Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować Cholisept o smaku miodowo-cytrynowym ostrożnie i zgodnie z informacją zamieszczoną w ulotce.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach u dorosłych lub po 3 dniach u dzieci, należy skontaktować się z lekarzem.

Cholisept o smaku miodowo-cytrynowym

Hexylresorcinolum + Benzalkonii chloridum

2,5 mg + 1,2 mg, tabletki do ssania

Skład:

Jedna tabletki do ssania zawiera jako substancje czynne: 2,5 mg heksylrezorcynolu i 1,2 mg chlorku benzalkoniowego oraz substancje pomocnicze: sacharozę granulowaną i płynną glukozę (50:50), glikol propylenowy, lewomentol, aromat cytrynowy 10748, aromat miodu 510167E, karmel, beta karoten 5%.

Dostępne opakowania:

10, 12, 16, 20 lub 24 tabletki.

Podmiot odpowiedzialny:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o., Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Wytwórca:

Ernest Jackson&Co Ltd., Crediton, Devon EX17 3AP, Wielka Brytania

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Cholisept o smaku miodowo-cytrynowym i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek Cholisept o smaku miodowo-cytrynowym
3. Jak stosować lek Cholisept o smaku miodowo-cytrynowym
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku Cholisept o smaku miodowo-cytrynowym
6. Inne konieczne informacje dotyczące leku Cholisept o smaku miodowo-cytrynowym

1. CO TO JEST LEK CHOLISEPT O SMAKU MIODOWO-CYTRYNOWYM I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Tabletki do ssania Cholisept o smaku miodowo-cytrynowym zawierają działający miejscowo znieczulająco i przeciwbakteryjnie heksylrezorcynol oraz chlorek benzalkoniowy o działaniu przeciwbakteryjnym.

Tabletki do ssania Cholisept o smaku miodowo-cytrynowym stosuje się objawowo w bólu i zapaleniu gardła.

2. ZANIM ZASTOSUJE SIĘ LEK CHOLISEPT O SMAKU MIODOWO-CYTRYNOWYM

Nie należy stosować leku Cholisept o smaku miodowo-cytrynowym, jeśli:

- występuje uczulenie (nadwrażliwość) na heksylrezorcynol, chlorek benzalkoniowy lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku,
- u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów (glukozy, sacharozy, fruktozy).

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Cholisept o smaku miodowo-cytrynowym

Jeśli objawy utrzymują się, należy skonsultować się z lekarzem.

Nie należy stosować dawki większej niż zalecana.

Stosowanie leku Cholisept o smaku miodowo-cytrynowym u dzieci

Nie należy podawać leku dzieciom w wieku poniżej 7 lat.

Ciąża

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie stwierdzono wpływu leku Cholisept o smaku miodowo-cytrynowym na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Cholisept o smaku miodowo-cytrynowym

Lek zawiera sacharozę i glukozę, patrz punkt „Nie należy stosować leku Cholisept o smaku miodowo-cytrynowym”.

Stosowanie innych leków

Nie stwierdzono oddziaływania leku Cholisept o smaku miodowo-cytrynowym z innymi lekami.

3. JAK STOSOWAĆ LEK CHOLISEPT O SMAKU MIODOWO-CYTRYNOWYM

Lek Cholisept o smaku miodowo-cytrynowym należy stosować zgodnie z zaleceniami podanymi w ulotce.

Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku) i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

Jedną tabletkę należy przyjmować co 3 godziny; tabletkę ssać powoli. Można przyjąć maksymalnie 8 tabletek na dobę.

Dzieci w wieku od 7 do 12 lat:

Jedną tabletkę należy przyjmować co 3 godziny; tabletkę ssać powoli. Można przyjąć maksymalnie 4 tabletki na dobę.

Nie należy podawać leku dzieciom w wieku poniżej 7 lat.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Cholisept o smaku miodowo-cytrynowym jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Cholisept o smaku miodowo-cytrynowym

Przedawkowanie heksylrezorcynolu może spowodować podrażnienie żołądka i jelit.

Po przyjęciu zbyt dużej dawki leku mogą wystąpić nudności, wymioty, biegunka, obfite pocenie się i zwiększone pragnienie związane z nadmiernym spożyciem lewomentolu.

Po odstawieniu leku należy zastosować leczenie objawowe.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku Cholisept o smaku miodowo-cytrynowym

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Cholisept o smaku miodowo-cytrynowym może powodować działania niepożądane. Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości na składniki leku.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Cholisept o smaku miodowo-cytrynowym mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. PRZECHOWYWANIE LEKU CHOLISEPT O SMAKU MIODOWO-CYTRYNOWYM

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.

6. INNE KONIECZNE INFORMACJE DOTYCZĄCE LEKU CHOLISEPT O SMAKU MIODOWO-CYTRYNOWYM

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o., Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
tel. (22) 576 96 00

Data opracowania ulotki